



La chenille est actuellement très active durant les heures ensoleillées. Traiter à ce moment-là.

Chenilles



Je suis	QUE FAIRE ?
<b>Professionnel</b> (détenteur d'une phytolice)	<b>SUR CHENILLES</b>
	Zones Zéro phyto : Traitement préventif : poudre de lave.
	Hors Zones Zéro phyto : Traitement préventif : poudre de lave Si présence de chenilles, traiter avec un produit à base de <i>Bacillus thuringiensis</i> : <b>Xentari, Florbac, Dipel DF</b> ou un produit à base de spinosad : <b>Tracer, VSM Spinosad, Conserve Pro, Boomerang</b> . Traiter pendant les heures chaudes durant lesquelles les chenilles sont actives. Bien appliquer à l'intérieur des plantes.
	<b>Pas de papillons adultes à cette époque</b>
	Toutefois, se procurer les pièges à phéromones et les capsules de phéromones mais ne pas encore les placer. Conserver les phéromones en frigo
<b>Particulier</b>	QUE FAIRE ?
	<b>SUR CHENILLES</b>
	Traitement préventif : poudre de lave Si présence de chenilles : traiter avec un produit à base de spinosad : <b>Conserve Garden, Boomerang Garden</b> à appliquer pendant les heures chaudes durant lesquelles les chenilles sont actives. Bien appliquer à l'intérieur des plantes. Ne pas utiliser les autres produits qui sont nuisibles pour les oiseaux et insectes utiles (Omni insect, Desect, Polysect, Eradibug ultra, Eradigun ultra).
	<b>Pas de papillons adultes à cette époque</b>
	Toutefois, se procurer les pièges à phéromones et les capsules de phéromones mais ne pas encore les placer. Conserver les phéromones en frigo



Retrouvez-nous sur notre page Facebook : CEHW

**IMPORTANT** : Ce document est une information officielle du Centre d'Essais Horticoles de Wallonie